



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

DIACIP

Composición

Diazinon?????????????.????25 g

? ? cipermetrina ??????????..... 1,50 g

Excipientes c.s.p?????????????...100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, caprinos y ovinos: garrapatas (*Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennense*), moscas (*Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*), ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*) y piojos (*Linognathus* sp., *Haematopinus* sp., *Damalinia bovis*).

Porcinos: ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*), piojos (*Haematopinus suis*).



Vía de Administración y dosificación:

Vía tópica, Baño por aspersión o baño por inmersión:

Bovinos: diluir 1 litro de DIACIP en 700 l de agua.

Ovinos, caprinos y porcinos: diluir 1 litro de DIACIP en 350 l de agua.

Forma farmacéutica:

Solución Tópica (Baño)

Efecto terapéutico:

Ectoparasitocida

Especies:



Presentaciones:

1 L y 286 ml

Tiempo de retiro:

Carne: 7 días.

Leche: 24 horas.

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: P.F 11831

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite