



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

DICLOPEN

Composición

Bencilpenicilina G benzatina ??? 150.000 UI

Bencilpenicilina G procaína???. 150.000 UI

Bencilpenicilina G sódica ?????. 100.000 UI

Dihidroestreptomicina (sulfato) ?? 125 mg

Diclofenaco de sodio ??????. 11,25 mg

Diluyente estéril c.s.p. ?????..... 1 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos y Equinos.

Tratamiento de infecciones primarias y secundarias acompañadas de inflamación aguda o crónica, causadas por gérmenes sensibles a la asociación bencilpenicilina G y dihidroestreptomicina, en particular:

Bovinos y equinos: Infecciones respiratorias (neumonía, bronconeumonía, septicemia hemorrágica, adenitis equina), infecciones puerperales (metritis, mastitis), infecciones del aparato locomotor (pododermatitis, artritis séptica) septicemias, heridas infectadas, abscesos, actinomicosis, carbón bacteriano.

Vía de Administración y dosificación:

Vía IM profunda.

Bóvidos y équidos: 2 - 6 ml de DICLOPEN/100 Kg p.v. (equivalente a 8.000 UI a 24.000 UI de Penicilina G/Kg p.v.) en función de la gravedad de la infección, en dosis única. En caso necesario, repetir la inyección al cabo de 72 horas.

Forma farmacéutica:

Suspensión Inyectable

Efecto terapéutico:

Antiinflamatorio no esteroideo AINES, Antibióticos/Antimicrobianos



Especies:  

Presentaciones:

20 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.

LECHE: 3 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con:

Hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos

Insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares. Edad inferior a un mes.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 10861

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite