



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

DIHIDROESTREX INYECTABLE

Composición

Dihidroestreptomina (sulfato) 50 mg
Excipiente c.s.p. 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Perros, Equinos, Aves.

Bovinos: Leptopirosis, Colibacicolis, Neumoenteritis, Pasteurelosis, Salmonelosis.

Porcinos: Leptospirosis, neumonía, Salmonelosis, Septicemia.

Ovinos y Caprinos: Aborto paratífico, Pasteurelosis.

Equinos: Aborto paratífico, Pasteurelosis, Septicemia.

Perros: Leptospirosis.

Aves: Coriza Infeccioso, Cólera aviar.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda.

Bovinos y Porcinos: 1 mL/10 Kg p.v. (50 mg de Dihidroestreptomina/ Kg p.v.), en dosis única.

Equinos, Ovinos y Caprinos: 0,5 mL/ 10 kg p.v. /día, durante 3 días.

Perros: 0,1 mL/ kg p.v. (50 mg de Dihidroestreptomina/ kg p.v.)/día, durante 3 días.

Administrar con precaución en animales con historial de alergias. Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes.

Evitar tratamientos prolongados, sobre todo en carnívoros.

Aves: Pollos, gallinas, pavos; 50 a 100 mg/kg p.v. del producto diluido 1:10 ó 1:20 con agua para inyección, en dosis única.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos



Especies:**Presentaciones:**

250 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.

LECHE: 2 días.

Contraindicaciones:

Animales con historial conocido de hipersensibilidad a aminoglicosidos. Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares. Animales con edad inferior a un mes. Equinos destinados al consumo humano. Hembras gestantes. No usar en ponedoras para huevos de consumo humano.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071432