



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

MASTIVEEX RETARD

Composición

Cloxacilina (benzatinica)?????.? 400 mg

Framicetina (sulfato)????..?? 200 mg

Excipiente c.s.p?????????????. 10 g

Descripción e indicaciones

MASTIVEEX RETARD está indicado para el tratamiento sistemático de todos los animales al final del periodo de lactación.

Mastitis subclínicas, causadas por diferentes agentes bacteriológicos.

En caso de profilaxis, después de una intervención quirúrgica de la ubre.

Tratamiento local de las heridas, erosiones, fistulas, abscesos y forúnculos de la ubre y en afecciones del canal galactóforo.

Vía de Administración y dosificación:

MASTIVEEX RETARD se administra por vía intramamaria, a la dosis de 1 inyector de 10 g por cuarterón en bovinos, equivalentes a 400 mg de cloxacilina + 200 mg de Framicetina sulfato. Para ovejas y cabras, la dosis es de medio inyector por cuarterón.

Para una mayor eficacia, la aplicación del producto debe acompañarse de las correspondientes medidas higiénicas y sanitarias a fin de prevenir la reinfección.



Forma farmacéutica:

Suspensión Intramamaria

Efecto terapéutico:

Antimastíticos

Especies:



Presentaciones:

Caja de 4 inyectores con 10 g cada uno.

Caja de 80 inyectores de 10 g cada uno.

Tiempo de retiro:

CARNE: 7 días.

LECHE: 4 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a sus componentes.

Nro. Registro S.A.S.A.: 2509

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite