



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

NANDROL

Composición

Nandrolona decanoato..... 2,5 g

Excipiente c.s.p.....100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, Porcinos, Equinos, Ovinos y Caprinos:

- Engorde.
- Retrasos en el crecimiento.
- Estados de debilidad en recién nacidos.
- Durante la convalecencia de enfermedades infecciosas y parasitarias (aftosa, anaplasmosis, babesiosis, verminosis pulmonar, distomatosis, estomatitis vesicular, neumonía, tripanosomiasis).
- Después de un parto difícil.
- Osteoporosis.
- Para combatir la descalcificación en las vacas lecheras de producción elevada
- En el curso y después de tratamientos de larga duración con corticoesteroides
- Anorexia y problemas nutricionales.
- Disminución de la fertilidad o agotamiento sexual en machos y hembras.
- Atrofias y distrofias musculares.

En Caninos y felinos domésticos (gatos) para el tratamiento de:

- Uremia.
- Artritis deformante.
- Durante y después de tratamientos de larga duración con corticosteroides.
- Para combatir la descalcificación.
- Síntomas de senilidad.
- En casos de fracturas.
- Después de heridas graves y de intervenciones quirúrgicas.



Vía de Administración y dosificación:

Vía IM o SC: 1 mg/kg. p.v. (1 ml de NANDROL/ 25 kg. p.v.) con un máximo

por animal de:

- Perros de 10 kg. O más: 25 mg (1 mL / animal)
 - Perros de menos de 10 kg. Y gatos: 12.5 mg (0.5 mL / animal)
 - Gatos: 12,5 mg (0,5 mL /animal).
 - Equinos y bovinos adultos: 200 mg (8 ml / animal)
 - Potros y terneros: 100 mg (4 mL / animal)
 - Cerdos, ovejas y cabras: 50 mg (2 mL / animal)
- Se recomienda repetir la inyección de 2 a 3 veces cada 2 o 3 semanas según la gravedad del caso individual a tratar.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Anabolizante hormonal

Especies:



Presentaciones:

10 y 50 mL

Tiempo de retiro:

Carne: 28 días.

Contraindicaciones:

No administrar en hembras preñadas, ya que puede causar virilización del feto.
En caballos de competición, usar de acuerdo con las regulaciones locales al respecto.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 8569

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite