LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

OXITETRACICLINA 200 L.A

Composición

Oxitetraciclina (dihidrato)??????????????....20 g
(Equivalente a 21,58 g oxitetraciclina dihidrato)
Excipiente c.s.p.????????????????????..100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: tratamiento de infecciones por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina, en particular: Neumopatías infecciosas, gastroenteritis infecciosas, abortos infecciosos (clamidiosis y brucelosis), panadizo, artritis, anaplasmosis, leptospirosis, y terapia de soporte en la metritis y mastitis.

Vía de Administración y dosificación:

En general, una dosis única de 1 ml de OXITETRACICLINA-200 L.A. /10 Kg p.v. vía intramuscular profunda. En lechones de peso vivo menor de 10 kg: 1 mL de OXITETRACICLINA -200 L.A./lechón, vía subcutánea.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

250 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 22 días.
LECHE: 3 días.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con antecedentes de sensibilidad a las tetraciclinas.
No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.
No administrar a équidos, produce enterocolitis disenteriforme mortal.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A **Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N072903