



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

ALBENDEX 10% SUSPENSION ORAL

Composición

Albendazol10 g
Excipiente c.s.p 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, Ovinos y Caprinos.

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares, producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos.

Tratamiento de teniosis producidas por *Moniezia* sp.

Tratamiento de distomatosis. No está recomendada para el tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas inmaduras.

Tratamiento y control de Nematodosis por Sacáridos (*Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*), Tricocefalos (*Trichuris vulpis*) y Ancylostomas (*Ancylostoma caninum*, *A. tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*).

Tratamiento y control de Teniosis por *Tenia pisiformis*, *Tenia hydatigena*, *Hydtígera taeniaeformis* y *Echinococcus granulosus*.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral, luego de agitarse el envase.

Bovinos, Ovinos y Caprinos:

Administrar en dosis única. Nematodosis y Teniasis: 5 mL/100 Kg p.v.

Fasciolosis: 10 mL/100 Kg p.v.

Forma farmacéutica:

Suspensión Oral

Efecto terapéutico:

Endoparasitocida

Especies:



Presentaciones:

200 mL, 1 L

Tiempo de retiro:

Carne de Ovinos y Caprinos: 10 días. Carne de Bovinos 14 días; Leche: 4 días.

Contraindicaciones:

No Administrar en los primeros 45 días de gestación.

En animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos de tipo bencimidazol, o a cualquier componente.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071882