



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A  
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca  
J-07524745-0

**Asistente Gerencia Ventas**

Amarilis Espinoza

**Contacto:** 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

## PENICILIN 4 MILLONES

### Composición

Benzilpenicilina G procaína????????? 3.000.000 UI

Benzilpenicilina G sódica?????????..?1.000.000 UI

### Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

Tratamiento de infecciones bacterianas, post-operatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la penicilina, tales como:

Bovinos: Abscesos cutáneos, actinomicosis, adenitis, afecciones pódales, neumonía y bronconeumonía, carbunco bacteridiano y sintomático, mastitis, metritis y onfalitis, infecciones genito-urinarias, septicemias, heridas infectadas.

Ovinos y caprinos: Abscesos cutáneos, neumonía y bronconeumonía, carbunco bacteridiano y sintomático, enterotoxemias (por Clostridium perfringens), mastitis, metritis, pasteurelisis, pedero, infecciones genito-urinarias, heridas infectadas.

Porcinos: Neumonía y bronconeumonía, carbunco bacteridiano, fiebre del transporte, leptospirosis, Mal rojo, metritis, septicemias y síndrome MMA.

Equinos: Abscesos cutáneos, afecciones pódales, neumonía y bronconeumonía, metritis, papera, carbunco bacteridiano.

### Vía de Administración y dosificación:

Vía IM profunda: Vía IM profunda.

Todas las especies: 0.75 ?1 ml /10 kg p.v. / día, durante 3 días.

? A la primera señal de una reacción de hipersensibilidad a la penicilina, debe darse intramuscularmente de 0.3 a 1 mL de inyección de adrenalina (o en casos severos 0.2 mL bien diluidos intravenosamente), seguido de una dosis adicional si no ocurre mejoría. Seguidamente debe administrarse antihistamínicos, tal como difenhidramina o clorfeniramina, dado parenteralmente y un corticosteroide dados intravenosamente.



**Forma farmacéutica:**

Solución Inyectable

**Efecto terapéutico:**

Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:****Presentaciones:**

20 mL

**Tiempo de retiro:**

CARNE: 7 días

LECHE: 3 días.

**Contraindicaciones:**

Está contraindicada en casos de hipersensibilidad a cualquier penicilina. En caso de alergia a la penicilina existe una alergia cruzada a todas las penicilinas, incluidos los derivados penicilínicos semisintéticos. Ocasionalmente puede darse una alergia cruzada a las cefalosporinas. No se conocen alergias cruzadas a otros antibióticos. Este producto también está contraindicado en casos de alergia al grupo "para" (la procaína posee un grupo amino en posición "para"). No inyecte dentro o cerca de una arteria o nervio, ya que puede resultar en un daño neurovascular severo.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** 4412

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite