



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

PENIVEEX COMPLEX L.A

Composición

Penicilina G. Procaína???????????.15.000.000 UI

Penicilina Benzatina?????.?????.5.000.000 UI

Dihidroestreptomicina (sulfato)??????????... 20 g

Clorfeniramina maleato????????????????? 1 g

Excipiente c.s.p????????????????????100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

Bovinos: infecciones respiratorias, infecciones genitourinarias, septicemias, metritis, actinomicosis, carbunco bacteriano, heridas infectadas, abscesos cutáneos, listeriosis, onfalitis.

Porcinos: artritis, síndrome MMA, neumonía, bronconeumonía, septicemia, mal rojo, metritis, heridas infectadas.

Ovinos y caprinos: neumonía, Pasteurellosis, infecciones genitourinarias, enterotoxemia, mastitis, metritis, carbunco bacteriano, heridas infectadas, abscesos.

Equinos: neumonía, carbunco bacteriano, metritis, abscesos cutáneos.



Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular profunda.

Bovinos y equinos adultos: 5-10 ml de PENIVEEX COMPLEX L.A. /100 kg p.v.

Porcinos, ovinos y caprinos: 0,5-1 ml de PENIVEEX COMPLEX L.A. /10 kg p.v.

Terneros y lechones: 0,75 ml de PENIVEEX COMPLEX L.A. /10 kg p.v. En general, administrar 2 ó 3 inyecciones con intervalo de 48 horas.

Forma farmacéutica:

Suspensión Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:**Presentaciones:**

10 mL, 100 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 30 días.

LECHE: 3 días.

Contraindicaciones:

No administrar a hembras gestantes, por existir riesgo de toxicidad cocleovestibular fetal.

No administrar a animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos.

No administrar a animales con insuficiencia renal, hematopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares.

No administrar a animales con edad inferior a un mes.

No administrar a Conejos, Cobayos y Hámster.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 041PN33N072143