



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A  
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca  
J-07524745-0

**Asistente Gerencia Ventas**

Amarilis Espinoza

**Contacto:** 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

## COCCIREX

### Composición

Sulfaquinoxalina sódica??.....??.. 44 g  
Pirimetamina ..... 12 g  
Excipiente c.s.p..... 1000 mL

### Descripción e indicaciones

Porcinos, aves, conejos, terneros, corderos:

Pollos: coccidiosis cecal e intestinal por Eimeria tenella, E. necatrix, E. maxima, E. brunetti, E. acevulina, E. mivati.

Conejos: coccidiosis hepática por Eimeria atiedae, E. perforaus, E. magna, E. irresidua.

Terneros y corderos: coccidiosis cecal e intestinal por E. bovis, E. zuernii.

Porcinos: coccidiosis cecal e intestinal por Eimeria suis, Eimeria sp.

### Vía de Administración y dosificación:

Vía oral en el agua de bebida.

Pollos y conejos: 1,5 ml/litro de agua de bebida/día, durante 3 días.

Retirar el tratamiento 2 días y reanudarlo administrando 1 ml/litro agua de bebida/día, durante 3 días.

Porcinos, corderos y terneros: 1 ml/10 kg p.v. /día, durante 5 días.

### Forma farmacéutica:

Polvo Oral

### Efecto terapéutico:

Anticoccidial

### Especies:



### Presentaciones:

1 Litro



**Tiempo de retiro:**

CARNE: 21 días.

LECHE: No usar.

**Contraindicaciones:**

No administrar a animales con procesos hemorrágicos, con alteraciones hepáticas o renales.

No administrar a aves reproductoras adultas, animales gestantes y rumiantes adultos.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** N/A

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N071897