



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.
J-30104680-3
Gerente General
Giuseppe Manilia
Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263
giuseppe.manilia@gmail.com
www.laboratoriostopp.com

Emitopp L.A

Composición

Oxitetraciclina Base???????????????? 200,00 mg
Excipientes, C.S.P???????????????????? 1,00 ml

Descripción e indicaciones

La Oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro, que actúa contra una gran variedad de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y contra el agente causal de la Anaplasmosis. En este preparado está incorporado a un vehículo especial que permite la obtención de niveles terapéuticos en el organismo que persisten hasta 96 horas y por consiguiente, pueden lograrse resultados curativos con una sola administración. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la síntesis proteica bacteriana mediante la inhibición del metabolismo del ácido glutámico de la célula evitando la transmisión del mensaje genético por el ARNt.

Anaplasmosis, mastitis, metritis, actibacilosis, difteria de los becerros, pododermatitis, onfalitis, bronquitis, neumonías, pleuritis, septicemia hemorrágica, leptirosis, Síndrome MMA (mastitis, metritis, agalaxia), rinitis atrófica, erisipela, abscesos, heridas infectadas, infecciones post-operatorias y post-parto, abortos por Clamidia spp en bovinos, suinos y ovinos.

Vía de Administración y dosificación:

1.0 ml/10 Kg de PV. Dosis máxima por sitio de inyección: 20 ml en bovinos, 10 ml en Suinos y 5 ml en ovinos. La dosis puede ser repetida a criterio del Médico Veterinario.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos



Especies:   

Presentaciones:

Frasco de 100 ml, y 250 ml.

Tiempo de retiro:

Carne: 21 días; Leche: 6 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 5.545

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite