

CARVAL VENEZUELA, S.A.
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO
EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15,
URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.
J-30785220-8

Gerente Comercial y Asesor Técnico

Freddy A. Martínez Mendez

Contacto: 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097

freddy.martinez@carval.com.ve

AVIFOS POLVO PARA SOLUCION

Composición

Cada 100 gramos de AVIFOS® contienen:

Fosfomicina Cálcica ??? 25g

Excipientes csp????????..100 g

Descripción e indicaciones

En pollos de engorde y aves de reemplazo para el tratamiento de Infecciones ocasionadas por *Escherichia coli*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella sp*, y *Staphylococcus sp*.



Vía de Administración y dosificación:

Vía de administración: Oral

Dosificación en alimento concentrado (Premix):

Aves terapéutica: 32 mg/kg principio activo lo que se traduce en

Arranque de pollitas y pollos de engorde : 80 A 100 ppm equivalente a 350 gr a 400 gr/Tn de alimentos de AVIFOS.

Aves en postura : 1 a 2 kg / Tn equivalente a 250 ppm a 500 ppm equivalente a 1 a 2 kg/Tn de alimento durante 7 días.

Dosificación en agua de bebida (Soluble): Usar 32 mg de principio activo/Kg. peso vivo/ 5 días o en forma practica 128 mg de AVIFOS/ Kg. peso vivo/ día en el Agua de bebida, durante 5 días.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Sobre Foil 500 g

Sacos Multipliegos de 5 kg

Tiempo de retiro:

Carnes: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

Huevos: No administrar en aves en período de postura.

Contraindicaciones:

La ciprofloxacina no es teratogena ni embriotóxica y no induce toxicosis hepática ni renal, pero no se recomienda administrarla a pacientes con este tipo de padecimientos.

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.: 8.678

Nro. Registro I.N.S.A.I. En Trámite