CARVAL VENEZUELA, S.A.
CALLE 10-A CON CALLE 5, EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ORINOCO, PISO 3 OFICINA 15, URBANIZACIÓN LA URBINA, MUNICIPIO SUCRE.
J-30785220-8
Gerente Comercial y Asesor Técnico
Freddy A. Martínez Mendez
Contacto: 0212-4193741-4193762 / 0241 6110097
freddy.martinez@carval.com.ve

TYLOVIC SOLUBLE

Composición

Cada 100 gramos de TYLOVIC SOLUBLE® contienen:
Tratrato de Tilosina 100 g
Excipientes c.s.p. 100 g

Descripción e indicaciones

En pollos de engorde y aves de reemplazo para el tratamiento de las enfermedades producidas por Mycoplasma gallisepticum (enfermedad respiratoria crónica) y Mycoplasma sinoviae.
En pavos para el tratamiento de infecciones producidas por Mycoplasma sp.
En porcinos para el tratamiento de la Disentería porcina producida por Treponema hyodisenteriae.

Vía de Administración y dosificación:

Administración vía oral suministrado en el agua de bebida.
Pollos de engorde, aves de reemplazo, reproductoras y pavos:
Administrar 110 mg/kg de peso vivo de Tartrato de tilosina o en forma práctica 500mg/L de agua. Puede ser utilizado a cualquier edad de acuerdo a la severidad del brote.
Porcinos: Administrar 1g/4 litros de agua

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Sobre Foil de 500 g y 1 kg.

Tiempo de retiro:

Aves: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.
Porcinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.
Huevo: No administrar en aves en periodo de postura.

Contraindicaciones:

No se presenta efectos indeseados, sí se maneja bajo la dosificación recomendadas por el Médico Veterinario.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I.: 8.677

Nro. Registro I.N.S.A.I. TRÁMITE