Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3
GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES
Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosuplidores.com.ve
www.agrosuplidores.com.ve

AUSKIPRA GN

Composición

Virus vivo Aujeszky ceba Bartha K61 gE negativa> 10 x 5.5 DICT 50
Excipientes c.s.p

Descripción e indicaciones

Prevenciòn de la enfermedad de Ausjeszky
Se ha desarrollado la vacuna AUSKIPRA GN , que contiene una cepa atenuada gE negativa (utilizando un ELISA se puede distinguir animales vacunados de los no vacunados),para contribuir asì a la progresiva erradicaciòn de la enfermedad.Esta cepa atenuada es apatògena para cerdos de cualquier edad y peso, e incluso para cerdas en avanzado estado de gestaciòn.
La protecciòn en animales sanos aparece a las 48 horas posvacunaciòn, aunque los niveles òptimos inmunitarios no se detectan hasta pasados 7 dìas

Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular, en los mùsculos del cuello, o intranasal.
Para administraciòn intramuscular, se puede emplear indistintamente el disolvente acuoso rojo (W) o el disolvente blanco (A3)
Para la administraciòn intranasal, se emplearà el disolvente acuoso rojo (W), aplicando 1 ml en cada fosa nasal.
Cerdos: 2 ml/ cerdo,a partir de las 10 semanas de edad ,independientemente de su peso,edad y sexo.
Cerdas y Verracos: Dos vacunaciones con intervalos de 3 a 4 semanas,a las cerdas de recrìa al entrar en la explotaciòn o al efectivo reproductor que nunca haya sido vacunado.Posteriormente,se efectuaràn revacunaciones cada 4 meses, o bien 4 a 6 semanas antes de cada parto.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Vacunas/Biológicos

Especies:

Presentaciones:

Caja con 10 frascos de 50 dosis cada uno

Tiempo de retiro:

0 dìas

Contraindicaciones:

ninguna

Nro. Registro S.A.S.A.: NO APLICA

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PI34N072898