



Representante: ILENDER VENEZUELA, C.A.
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O
C-10, Valencia ?Estado Carabobo
J-30124963-1

Gerente de Operaciones
Jaimalida Cardozo

Contacto: 0241-8570368
jcardozo@ilendercorp.com
www.ilendercorp.com



NORCARE

Composición

Norfloxacina 200 g
Excipientes c.s.p. 1000 mL

Descripción e indicaciones

El producto se presenta en solución líquida transparente y límpida, sin partículas en suspensión, de color amarillo claro.

INDICACIONES DE USO

NORCARE, presenta un amplio espectro de acción siendo activo contra bacterias

Gram positivas, Gram negativas, parte de la población anaerobia patógena y

microorganismos resistentes a otros antibióticos. La norfloxacina es bactericida ya que inhibe la síntesis bacteriana del ADN e impide la duplicación bacteriana.

Vía de Administración y dosificación:

NORCARE está formulado para ser administrado por vía oral en combinación con el agua de bebida.

Aves (Pollos y gallinas):

12 mg/kg de peso vivo al día durante 3 a 5 días.

(1 L de NORCARE alcanza para 16,666 kg de peso vivo)

Cerdos:

5 mg/kg de peso vivo al día durante 3 a 5 días.

(1 L de NORCARE alcanza para 40,000 kg de peso vivo)

*Administrar en forma constante en el agua de bebida de las especies mencionadas. Adminístrese en forma continua durante 3 ? 5 días.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:**Presentaciones:**

NORCARE se encuentra disponible en una presentación:

- Frasco plástico x 1 L.

Tiempo de retiro:

Retirar el producto siete días antes del sacrificio.

Contraindicaciones:

- No debe ser usado en gallinas ponedoras cuyos huevos serán destinados al consumo humano.
- No debe ser utilizado simultáneamente con la aplicación de vacunas contra coccidiosis y/o nitrofuranos.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 6.101

Nro. Registro I.N.S.A.I. EN TRÁMITE