



Representante: ILENDER VENEZUELA, C.A.
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O
C-10, Valencia ?Estado Carabobo
J-30124963-1

Gerente de Operaciones

Jaimalida Cardozo

Contacto: 0241-8570368

jcardozo@ilendercorp.com

www.ilendercorp.com



SALINACOX MG

Composición

Salinomycin 120 g

Excipientes c.s.p. 1000 g

Descripción e indicaciones

Polvo microgranulado homogéneo de color marrón.

INDICACIONES DE USO

SALINACOX MG tiene amplio espectro anticoccidial empleado para la prevención y control de la coccidiosis en pollos de carne y pollas de reemplazo, causadas por *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

SALINACOX MG está diseñado para ser utilizado sólo o en programas Rotacionales, con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias, asegurando un correcto control de la coccidiosis por largos períodos.

Vía de Administración y dosificación:

SALINACOX MG está formulado para ser administrado por vía oral en combinación con el alimento balanceado.

Mezclar 500 gramos de SALINACOX MG en una tonelada de alimento para obtener una concentración final de 60 ppm de principio activo.

Administrar en forma constante en la ración diaria de aves.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Anticoccidial

Especies:



Presentaciones:

SALINACOX MG se encuentra disponible en una presentación:

- Sacos de papel tetralaminar x 25 kg.

Tiempo de retiro:

Retirar el producto cinco días antes del beneficio.

Retirar el producto siete días antes del inicio de postura.

Contraindicaciones:

- Evitar la administración de SALINACOX MG con productos que contengan tiamulina, cloranfenicol, u oleandomicina en su composición.
- No administrar en forma simultánea con otros ionóforos del mismo grupo.
- No utilizar en caballos, pavos, hámster y rumiantes.
- No usar en ponedoras en producción.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.I 9.147

Nro. Registro I.N.S.A.I. EN TRÁMITE