LABORATORIOS PHARMAKUM DE VENEZUELA, C.A.

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com

ANAPOX 200 L.A



Composición

Oxitetraciclina HCL????????.200 mg
Excipientes c.s.p???????????1 ml

Descripción e indicaciones

La Oxitetraciclina es un agente bacteriosta?tico de amplio espectro, de actividad contra una gran variedad de bacterias Gram-positivas y Gram negativas. Actu?a penetrando en el citoplasma a trave?s de la membrana celular, impidiendo la adicio?n de aminoa?cidos a las cadenas pepti?dicas, inhibiendo la si?ntesis prote?ica de los ribosomas. Esta inhibicio?n de la si?ntesis prote?ica reduce notablemente la tasa de desarrollo y multiplicacion de los microorganismos.

ANAPOX 200 L.A.®, esta? indicado en todas las especies.
En Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos. Para el tratamiento de infecciones por ge?rmenes sensibles a la Oxitetraciclina: Neumoni?as, Pasteurelosis, Enteritis Bacteriana, Anaplasmosis, Neumoenteritis, Mastitis, Metritis y Abortos Infecciosos.

Vía de Administración y dosificación:

Vi?a intramuscular profunda en Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos adultos a la dosis de 1 ml/10 kg de p.v. (20mg de Oxitetraciclina / kg p.v.). En lechones de menos de 10 kg administrar 1ml/lechon, por vi?a subcuta?nea.

En Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos para el tratamiento de neumonias, mastitis, metritis, leptospirosis, pasteurelosis, septicemia hemorra?gica, aborto enzoo?tico, heridas infectadas, infecciones de ombligo y otras causadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina.

Dosis:

Bovinos: 1 ml/10 Kg pv. vi?a intravenosa o intramuscular profunda, no aplicar ma?s de 20 ml en el mismo lugar.

Cerdos: 1 ml/10 Kg pv. vi?a intramuscular profunda, no aplicar ma?s de 10 ml en el mismo lugar. En cerdos menores de 10 Kg de peso se recomienda la vi?a subcuta?nea. Ovinos y Caprinos: 1 ml/10 Kg pv. vi?a intramuscular profunda.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Frascos de 100 ml empaques de 24 unidades.
Frascos de 250 ml empaques de 24 unidades.
Frasco de 500ml empaques de 24 unidades.

Tiempo de retiro:

Animales de carne 28 di?as. Animales de leche 7 di?as.

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I.

INSAI2041PN33N0

71017