

Gan-OXI LA

Composición

Cada mL contiene:

-Oxitetraciclina: 200 mg.

-Excipientes c.s.p.:1 mL

Descripción e indicaciones

En Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Aves para el tratamiento de enfermedades causadas por: Anaplasma sp., Streptococcus sp., Clostridium sp., Pasteurella sp., Haemophilus sp., Escherichia coli, Leptospira sp., Listeria sp. y Campylobacter sp.

Vía de Administración y dosificación:

Vía de administración:

-Bovinos, porcinos, ovinos caprinos: intramuscular

-Aves: subcutánea.

Dosis: 1 mL / 10 kg de peso.

-Aves: 0.25 mL por cada kg de peso.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Frasco x 50 mL

Frasco x 100 mL

Frasco x 250 mL

Frasco x 500 mL

Tiempo de retiro:



Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

Contraindicaciones:

No aplica.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica.

Nro. Registro I.N.S.A.I. En trámite.