



Representante: AGROSUPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07

J-31353351-3

GERENTE GENERAL

ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214

alejandrolinares@agrosuplidores.com.ve

www.agrosuplidores.com.ve



HIPRADOG-7

Composición

Composición por dosis (1ml)

Fracción Liofilizada:

Virus parvovirus canina (CPV) cepa C-780916 > 10 x 6 DICT50; Virus vivo moquillo (CDV) cepa Lederle > 10 x 4 DICT50; Adenovirus vivo tipo 2

(CAV2) cepa Manhattan > 10 x 4 DICT50; Virus vivo Parainfluenza canino

(CPIV) cepa Penn 103/70 > 10 x 5 DICT 50

Excipientes c.s.p



Descripción e indicaciones

Indicado para la prevención de Parvovirus, Moquillo, Hepatitis,

Laringotraqueitis, Traqueobronquitis y Leptospirosis en perros

La parvovirus, el moquillo, la hepatitis, la laringotraqueitis, la traqueobronquitis y la leptospirosis caninas son enfermedades que pueden afectar a perros de cualquier edad, llegando a producir incluso la muerte.

En las primeras semanas de vida, la mayor parte de los animales están protegidos por los anticuerpos maternos. Al declinar éstos en las semanas subsiguientes, los animales se vuelven susceptibles a la infección.

La vacunación sistemática de cachorros y adultos produce un nivel de anticuerpos frente a estas enfermedades de una magnitud suficiente para asegurar la protección de los animales. Además, en el caso de la leptospirosis, evitaremos que existan animales portadores asintomáticos que podrían ser un peligro potencial por el riesgo de transmisión de la enfermedad al hombre.

Vía de Administración y dosificación:

Subcutánea

Perros: 1 ml/ perro, independientemente de su peso, edad, sexo y raza.

Tranqsar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la fracción liofilizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración

Es aconsejable administrar la primera vacuna a las 8 semanas y revacunar a las 12 semanas.

Se recomienda una dosis de refuerzo anualmente

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Vacunas/Biológicos

Especies: 

Presentaciones:

Envase de 10 dosis (fracción liofilizada + fracción líquida)

Tiempo de retiro:

No aplica

Contraindicaciones:

No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infectocontagiosa.

Como no se ha demostrado la inocuidad de esta vacuna en hembras gestantes , no se aconseja su utilización en estos animales

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PI 34N071277