LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y 27 Turmero Estado Aragua.
J-30104680-3
Gerente General
Giuseppe Manilia
Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263
giuseppe.manilia@gmail.com
www.laboratoriostopp.com

Vitatopp Liquido con Aminoacidos



Composición

Vitamina A:	5.000.000,0 Ul
Vitamina D3:	1000.000,0 Ul
Vitamina E:	10,0 gr
Vitamina K3:	1,2 gr
Vitamina B1:	1,5 gr
Vitamina B2:	2,5 gr
Vitamina B6:	2,0 gr
Vitamina B12:	10,0 gr
Vitamina C:	25,0 gr
nicotinamida:	15,0 gr
D-pantenol:	5,0 gr
Metionina:	10,0 gr
Lisina:	20,0 gr

Descripción e indicaciones

El papel de la vitamina E no está totalmente establecido, dado que no se conoce ninguna otra actividad biológica concreta además de su efecto como antioxidante. Dado su papel como antioxidante de los lípidos, las necesidades están relacionadas con el grado de insaturación de las grasas de la dieta. La carencia de vitamina E es rara en humanos, y está

relacionada casi siempre con defectos en la absorción intestinal de las grasas. La carencia de vitamina E produce problemas neurológicos, que, al contrario de lo que sucede en otras enfermedades producidas por carencias vitamínicas, revierten muy lentamente. Esto es debido probablemente a que el daño sufrido se debe a la oxidación de los lípidos. En algunos animales la deficiencia de vitamina E produce distrofia muscular, especialmente en los pollos, o problemas reproductivos.
Las funciones clásicas de la vitamina D abarcan el control de la homeostasis del calcio, la regulación del crecimiento y desarrollo del hueso y la regulación del metabolismo del fósforo.
Las vitaminas del complejo B estimulan el apetito y la producción de glóbulos rojos, mejoran la actividad del aparato locomotor, previenen y curan trastornos del sistema nervioso y, además, intervienen en importantísimas funciones ligadas al metabolismo de carbohidratos, grasas y proteína. Lisina y Metionina figuran entre los aminoácidos de mayor importancia para las para las aves.

Estados carenciales de vitaminas, estados de desnutrición y debilidad, convalecencia, tratamientos prolongados con antibióticos y otros quimioterapicos, stress por diferentes causas (vacunaciones, cambio de alimentación, altas temperaturas Etc.) descenso de la postura, como estimulante del crecimiento y para mejorar la capacidad reproductiva y productiva, durante y después de la muda en ponedoras

Vía de Administración y dosificación:

Oral
Preventivo: 1 ml por litro de agua.

Curativo: 2 ml por litro de agua durante 3 a 5 días a criterio del MV.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Reconstituyente,Suplemento nutricional vitamínico

Especies:



Presentaciones:

Litro - Galon

Tiempo de retiro:

N/A

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F: 7.169 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite