



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

CEPTIFUR

Composición

Ceftiofur (clorhidrato) 5 g
(equivalente a 5.71 g ceftiofur clorhidrato)
Excipiente c.s.p..... 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos y Porcinos.

Porcinos: Tratamiento y control de la enfermedad respiratoria bacteriana porcina (neumonía) asociada con *Salmonella cholerae suis*; *Pasteurella multocida*; *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis* Tipo 2.

Bovinos: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (BRD) conocida también como fiebre del transporte y neumonía bovina, asociada con *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somni*, incluyendo el tratamiento del vacuno de leche.

Tratamiento de la necrobacilosis interdigital bovina aguda (degeneración de pies y pododermatitis), asociada con *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.



Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular

Porcino: 3-5 mg de ceftiofur/kg p.v. /día, (equivalente a 0.6-1 ml de CEPTIFUR /10 kg p.v. /día), durante 3 días consecutivos.

Bovino: 1,1- 2,2 mg de ceftiofur/kg p.v. /día, (equivalente a 2,2 - 4,4 ml de CEPTIFUR /100 kg p.v. /día), durante 3 días consecutivos. Puede prolongarse el tratamiento 2 días más si los animales no muestran una respuesta satisfactoria.

Forma farmacéutica:

Suspensión Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:  

Presentaciones:

100 mL

Tiempo de retiro:

CARNE: 5 días.

LECHE: no precisa.

Contraindicaciones:

No administrar a animales sensibles a las cefalosporinas.

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F 8567

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite