LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y 27 Turmero Estado Aragua.
J-30104680-3
Gerente General
Giuseppe Manilia
Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263
giuseppe.manilia@gmail.com
www.laboratoriostopp.com

Tiamfenicol 25 Inyectable

Composición

Tiamfenicol 25,00 g

Excipiente, C.S.P. 100,00 ml

Descripción e indicaciones

El Tianfenicol, un antibiótico sintético que evita la formación del enlace peptídico en la última parte de la biosíntesis proteica al unirse al ribosoma y bloquear la acción de la peptidil-transferasa. Su efecto final es inhibir la multiplicación bacteriana, por lo que es un producto primariamente bacteriostático que, administrado en dosis ligeramente más elevadas, es también bactericida.
Después de su administración, el Tiamfenicol se absorbe rápidamente y se distribuye de manera extensa a los tejidos corporales. Este principio activo muestra poca unión a proteínas plasmáticas y la mayor parte de la dosis administrada se excreta del animal en su forma original dentro de 48 horas. Después de su administración, el Tianfenicol aparece rápidamente en la bilis.

Neumonía y Bronconeumonía bacteriana y micoplásmica, enteritis, peritonitis, poliserositis, disentería hemorrágica suina; mastitis, nefritis, pielonefritis, cistitis, uretritis, metritis, pododdermatitis en infecciones articulares; septicemias, onfalitis, mal rojo del cerdo, salmonelosis, colibacilosis y clamidiasis en bovinos y suinos.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular o intravenosa.
Dosis: 25-50mg/kg PV/día, preferiblemente subdivididos en dos (2) administraciones, durante 3 días.
Tiempo de Retiro: 8 días para animales de carne y 48 horas en animales de leche.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

Envases de 100 ml

Tiempo de retiro:

Carne: 8 días; Leche: 2 días

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F. 11.931

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite