



LABORATORIOS TOPP, C.A  
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y  
27 Turmero Estado Aragua.

J-30104680-3

**Gerente General**

Giuseppe Manilia

**Contacto:** 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263

giuseppe.manilia@gmail.com

www.laboratoriostopp.com

## Topptraz 700

### Composición

Amitraz 12.50% p/v (equivalente a 125.00 g/L a 20°C)

Excipientes 87.50% p/v

### Descripción e indicaciones

El Amitraz es sobre todo un excelente garrapaticida, y hay muchos productos genéricos, también de laboratorios multinacionales. Es un antiparasitario externo eficaz contra garrapatas resistentes a organofosforados y piretroides. Además del efecto letal sobre las garrapatas, también tiene efecto repelente, lo que hace que éstas se suban menos a los animales tratados que penetran en pastos infestados. Esto es en sí una propiedad beneficiosa del amitraz. Ahora bien, dicha repelencia puede tener la consecuencia de que la población de garrapatas en los pastos no se reduce al tratar con amitraz el ganado que lo ocupa. Como las garrapatas -en el caso de *Boophilus microplus*, las larvas- no se suben o suben menos al ganado tratado, y éste parece limpio, puede pensarse que los pastos están limpios también. Si se introduce en esos pastos ganado no tratados puede haber sorpresas desagradables.

Control de garrapatas de uno más hospedadores, incluyendo cepas resistentes a organofosforados, carbamatos y piretroides sintéticos; piojos y ácaros de la sarna en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos.

### Vía de Administración y dosificación:

Modo de empleo: aplicar con baño de inmersión, con manga de aspersión o por aspersión con bomba de mochila o de motor.

Diluciones de uso:

- Contra garrapatas: 1litro/700 litros de agua (100 ml/7 Lt); de no obtenerse repuesta satisfactoria puede usarse 1L/500 Lt a 1Lt/600 Lt
- Contra ácaros de la sarna y piojos: 1 Lt/500 Lt en bovinos; 1 Lt/400 Lt en ovinos y caprinos; 1 Lt/250 Lt en porcinos; 20 ml/10 Lt contra la sarna sarcóptica y 40 ml/10 Lt contra la sarna dermodéctica en caninos.
- Preparar la solución inmediatamente antes de usarla y desechar lo que



quede en el depósito, ya que el producto diluido se degrada en 48 horas.

**Forma farmacéutica:**

Solución Tópica (Baño)

**Efecto terapéutico:**

Fungicida, Insecticida

**Especies:** 

**Presentaciones:**

Litro

**Tiempo de retiro:**

Carne: 3 días; Leche: 3 días

**Contraindicaciones:**

N/A

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.F: 6.649

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** En tramite