LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

ALBENDEX 10% SUSPENSION ORAL

Composición

Albendazol .....10 g
Excipiente c.s.p ..... 100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos, Ovinos y Caprinos.
Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares, producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos.
Tratamiento de teniosis producidas por Moniezia sp.
Tratamiento de distomatosis. No está recomendada para el tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas inmaduras.
Tratamiento y control de Nematodosis por Sacáridos (Toxocara canis, T. cati, Toxascaris leonina), Tricocefalos (Trichuris vulpis) y Ancylostomas (Ancylostoma caninum, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala).
Tratamiento y control de Teniosis por Tenia pisiformis, Tenia hydatigena, Hydtígera taeniaeformis y Echinococcus granulosus.

Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral, luego de agitarse el envase.
Bovinos, Ovinos y Caprinos:
Administrar en dosis única. Nematodosis y Teniasis: 5 mL/100 Kg p.v.
Fasciolosis: 10 mL/100 Kg p.v.

Forma farmacéutica:

Suspensión Oral

Efecto terapéutico:

Endoparasiticida

Especies:

Presentaciones:

200 mL, 1 L

Tiempo de retiro:

Carne de Ovinos y Caprinos: 10 días. Carne de Bovinos 14 días; Leche: 4 días.

Contraindicaciones:

No Administrar en los primeros 45 días de gestación.
En animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos de tipo bencimidazol, o a cualquier componente.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A **Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N071882