LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

TYLOSINA 200



Composición

Tilosina (base)??????????????????.20 g
Excipientes c.s.p. ?????..?????????.100 mL

Descripción e indicaciones

Bovinos: Neumoenteritis (bobita), Neumonía, Difteria, Pododematitis, Metritis.
Ovinos y caprinos: Agalaxia contagiosa aguda, Pleuroneumonía y metritis.
Porcinos: Neumonía enzoótica, artritis micoplásmica, disentería vibriónica, mal rojo (erisipela) y metritis.

Vía de Administración y dosificación:

Vía Intramuscular.
Bóvidos adultos: 0.5-1 ml de TYLOSINA 200 / 20 kg p.v. / día.
Terneros, cerdos adultos, ovinos y caprinos: 1 ml de TYLOSINA 200 / 20 kg p.v. / día.
Lechones: 0.25 ml de TYLOSINA 200 / 5 kg p.v. / día.
Tratar durante 3 días. En casos muy graves, repetir la inyección cada 12 horas.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:

Presentaciones:

100 mL

Tiempo de retiro:

Carne: Bovinos, Ovino, Caprino: 21 días, Cerdos: 4 días.

Leche: 72 horas.

Contraindicaciones:

Animales sensibles al Tilosina y en patologías que comprometan la función hepática.
(Se recomienda No utilizar en equinos su uso es fatal).

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A **Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N072163