LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

COCCIREX

Composición

Sulfaquinoxalina sódica??.....??.. 44 g
Pirimetamina ..... 12 g
Excipiente c.s.p..... 1000 mL

Descripción e indicaciones

Porcinos, aves, conejos, terneros, corderos:
Pollos: coccidiosis cecal e intestinal por Eimeria tenella, E. necatrix, E. maxima, E. brunetti, E. acevulina, E. mivati.
Conejos: coccidiosis hepática por Eimeria atiedae, E. perforaus, E. magna, E. irresidua.
Terneros y corderos: coccidiosis cecal e intestinal por E. bovis, E. zuernii.
Porcinos: coccidiosis cecal e intestinal por Eimeria suis, Eimeria sp.

Vía de Administración y dosificación:

Vía oral en el agua de bebida.
Pollos y conejos: 1,5 ml/litro de agua de bebida/día, durante 3 días.
Retirar el tratamiento 2 días y reanudarlo administrando 1 ml/litro agua de bebida/día, durante 3 días.
Porcinos, corderos y terneros: 1 ml/10 kg p.v. /día, durante 5 días.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Anticoccidial

Especies:

Presentaciones:

1 Litro

Tiempo de retiro:

CARNE: 21 días.
LECHE: No usar.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con procesos hemorrágicos, con alteraciones hepáticas o renales.
No administrar a aves reproductoras adultas, animales gestantes y rumiantes adultos.

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A **Nro. Registro I.N.S.A.I.** 2041PN33N071897