LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0
Asistente Gerencia Ventas
Amarilis Espinoza
Contacto: 0243-5515432 5516403
ventas@reveex.com
www.reveex.com

HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS

Composición

Vitamina A??????..... 20.000.000 UI
Vitamina D3?????..... 5.000.000 UI
Vitamina E???????????. 9 g
Vitamina B1???????????. 5 g
Vitamina B2???????????.. 10 g
Vitamina B6???????????. 3 g
Vitamina B12????????? 30 mg
Vitamina C???????????.. 50 g
Vitamina K3???????????.. 5 g
Ácido fólico???????????. 1 g
Ácido nicotínico????????. 20 g
Pantotenato de Calcio????.. 10 g
Acido aspártico???????.. 14,5 g
Treonina????????????.6,4 g
Serina????????????? 6,6 g
Acido glutámico???????. 26,4 g
Prolina???????????? 11,5 g
Glicina???????????? 15,3 g
Alanina???????????? 17,4 g
Cistina???????????? 1,26 g
Metionina???????????? 11,1g
Isoleucina???????????? 9,8 g
Leucina?????????????20,1 g
Fenilalanina?????????? 7,7 g
Tirosina???????????? 6,8 g
Lisina???????????? 20,7 g
Histidina???????????? 5,6 g
Arginina???????????? 14,1 g
Triptófano????????????3,67 g
Excipientes c.s.p??????? 1000 ml

Descripción e indicaciones

HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS se administra a rumiantes, porcinos, aves, conejos en los tratamientos relacionados con estados carenciales de vitaminas y aminoácidos, como:
1. Promotor de crecimiento y producción animal.
2. Después de un periodo deficiente de la alimentación acompañado de un cambio sustancial en el sistema nutricional.
3. En cualquier estado infeccioso, junto con el tratamiento etiológico o durante las vacunaciones, a fin de aumentar las defensas orgánicas.
4. En estado de convalecencia posterior a enfermedades infecciosa y parasitarias, como bioestimulante.
Aves de compañía: indicado en la muda, avitaminosis en general, inapetencia, convalecencia, stress.
Perros y gatos: avitaminosis, convalescencia, anorexia en la gestación y lactación, como activador de crecimiento, complemento aminoácido ? vitamínico.

Vía de Administración y dosificación:

Vía oral en el agua disuelta en el agua de bebida durante 5 días.
Avicultura:
Gallinas y Broilers: 0,5- 1 ml / litro de agua de bebida/día.
Como promotor del crecimiento: 0.5 ml / litro de agua de bebida/día, durante los primeros 5 días de vida o después de la vacunación contra gumboro o sobre los 30 días, durante 5 días.
Porcinos:
Lechones lactantes: 2 ml / L de agua de bebida/día.
Cerdos de engorde: 0,5 ml / L de agua de bebida/día.
Cerdas en lactancia: 2 ml / L de agua de bebida/día.
Administrar durante 5 días.
Bovinos, ovinos, caprinos:
Animales jóvenes: 1 ml / L de agua de bebida/día.
Animales adultos: 0.5 ml / L de agua de bebida/día.
Administrar durante 5 días.
Conejos: 2 mL / litro de agua de bebida/día, durante 7 días.
Pájaros: Muda: 2 mL/litro de agua de bebida/ el primer día y 1 ml /litro de agua de bebida/día, hasta su terminación.
Otros tratamientos: 2 mL/L de agua de bebida/día durante 5 días.
Perros: 5 a 10 mL/perro/día, según peso, durante 10 a 12 días.
Gatos: 3 a 5 ml/ gato/día, según peso durante 10 a 12 días.

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Suplemento nutricional vitamínico

Especies:

Presentaciones:

30 mL, mL, 1 Litro,

Tiempo de retiro:

N/A

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N072223