



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

BRONCOVEEX

Composición

Bromhexina (clorhidrato) 1 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:

Esta indicado por su acción mucolítico secretolítico y expectorante como un eficaz coadyuvante en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco viscoso bronquial en aves, porcinos, bovinos y equinos. Es útil en reacciones postvacunales de las aves.



Vía de Administración y dosificación:

Administrar por vía oral.

Dosis Farmacológica:

? Aves: 0,02 mg por kg de peso

? Cerdos, Bovinos y Equinos: 20 ml / 40 kg (equivalente a una dosis de 0,5 mg de bromhexina por kg)

Oral disuelto en el agua de bebida por 5 a 7 días.

? Para aves de corral 100 ml en 1000 L de agua.

? Cerdos 0,2 a 0,5 ml / animal

? Lechones 0,1 a 0,25 ml / animal

? Becerros 0,3 a 0,7 ml / animal

? Bovinos y Equinos 1 a 1,5 ml / animal

Forma farmacéutica:

Solución Oral

Efecto terapéutico:

Broncodilatador

Especies:



Presentaciones:

1 Litro

Tiempo de retiro:

Carne de Aves y porcinos: cero días

Bovinos: 2 días antes.

Leche: No usar.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con:

-Edema pulmonar.

-En periodos de lactancia y gestación.

- Equinos: No administrar a animales sospechosos de trastornos digestivos.

Nro. Registro S.A.S.A.: 6467

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite