



BAYER, S.A.  
Ave. Tamanaco, Torre Bayer, El Rosal  
J-00030445-9

**Gerente de Producto Jr.**

María Elisa Martino

**Contacto:** 0800 BAYER 01 (0800-22937-01) (0212)905.21.91

mariaelisa.martino@bayer.com

www.sanidadanimal.bayerandina.com

## BAYTRIL® SOLUCION INYECTABLE 5%

### Composición

Cada mL contiene:  
Enrofloxacina 50 mg  
Excipientes c.s.p. 1 mL

### Descripción e indicaciones

En bovinos, ovinos y caprinos:

- \* Infecciones respiratorias: Bronconeumonías, complejo neumónico, neuroenteritis o peste boba, septicemia hemorrágica o fiebre de embarque, mycoplasmosis.
- \* Infecciones del aparato digestivo: Diarreas infecciosas, diarrea neonatal en terneros, colisepticemia, salmonelosis.
- \* Infecciones del aparato genitourinario: Pielonefritis, endometritis, piómetras.
- \* Infecciones de la piel y tejidos blandos: Infecciones del ombligo, heridas infectadas, dermatitis, abscesos.
- \* Infecciones septicémicas por: Escherichia coli, Salmonella spp, Haemophilus spp.

Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales producidas por gérmenes sensibles a Baytril®.

En Cerdos:

- \* Infecciones del aparato respiratorio: Pleuroneumonía infecciosa, Neumonía enzoótica, Rinitis atrófica, Complejo neumónico.
- \* Infecciones del aparato digestivo: Colibacilosis, salmonelosis y septicémia.
- \* Infecciones del aparato genitourinario: infecciones renales, síndrome metritis ? mastitis - agalactia (MMA).
- \* Infecciones septicémicas: por E. coli, Salmonella spp y otras.
- \* Infecciones de la piel: Eczema húmedo, otras.
- \* Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades vírales producidas por gérmenes sensibles a Baytril®.



En caninos y felinos:

- \* Infecciones del tracto digestivo:
- \* Infecciones de los órganos respiratorios.
- \* Infecciones del tracto urogenital: Nefritis, cistitis, pielonefritis.
- \* Infecciones cutáneas, heridas infectadas, dermatitis.

### Vía de Administración y dosificación:

Bovinos, ovinos, caprinos:

Administrar 5 mL por 100 Kg de peso por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa, cada 24 horas por 3 días.

En enfermedades respiratorias severas duplicar la dosis y continuar el tratamiento por 5 días.

En Salmonelosis, cada 24 horas por 5 días.

Porcinos:

Administrar 1 mL por 10 Kg de peso por vía intramuscular en la musculatura anterior del cuello, cada 24 horas por 3 días.

Caninos:

Administrar 1 mL por 10 Kg de peso.

En enfermedades crónicas tratamiento por 10 días.

Felinos:

Administrar de 2,5 mg a 5 mg por kilo.

### Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

### Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

### Especies:



### Presentaciones:

Frasco de 100 mL

### Tiempo de retiro:

Carne: 8 días después de finalizado el tratamiento.

Leche: 8 días después de finalizado el tratamiento.

### Contraindicaciones:

Precauciones:

- \* No aplicar dosis intramusculares o subcutáneas mayores a 10 mL por inyección.
- \* No aplicar en Cerdos volúmenes mayores de 2.5 mL en el mismo sitio de aplicación y en Becerros no más de 5 mL.
- \* No administrar a perros menores de 12 meses de edad para razas pequeñas y perros menores de 18 meses de edad para razas grandes y gigantes.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I. 2.977

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** NO APLICA