



LABORATORIOS VALMOR, C.A.
Av. Bolívar, N° 242, Edificio Valmorca
J-07002946-3

Jefe de Productos

Ayllen J Aure

Contacto: 0274-2212324 , Fax 0274-2212075

aaure@valmorca.com.ve

www.valmorca.com.ve

Oxitetraciclina 50mg/mL.Solución Inyectable

Composición

Cada mL contiene
Oxitetraciclina base

..... 50 mg (Equivalente a 53,96
mg de Oxitetraciclina Base)
Vehículo c.s.

Descripción e indicaciones

En Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos: en casos de: neumonía, Clamidirosis, Nocardiosis, Mycoplasmosis, Queratoconjuntivitis, Mastitis, Metritis, Nefritis aguda y Pododermatitis. En caninos en caso de ehrlichiosis. En Bovinos, Ovinos y Caprinos en anaplasmosis, septicemia hemorrágica o fiebre del transporte. En diarreas en Becerras. Aves: sinusitis infecciosa, coriza y clamidirosis.



Vía de Administración y dosificación:

Inyección intramuscular, intravenosa lenta, Intraperitoneal o Infusión Intramamaria.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

20,100,500 mL

Tiempo de retiro:

Leche 22 Días. Bovinos, Ovinos y Caprinos y Carne: 22 días en Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos y Aves

Contraindicaciones:

En caso de insuficiencias renal la Oxitetracina agrava el cuadro. En animales jóvenes lactantes no debe administrarse ya que interfiere en el crecimiento. En el sitio de inyección se forman reacciones de hipersensibilidad (edema con dolor al tacto) que van desapareciendo con el tiempo. En caso de sobredosis puede ocurrir hepatotoxicidad.

Nro. Registro S.A.S.A.: No Aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0

71430