



Representante: AGROSUPPLIDORES FL. C.A
ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 97,CC
MALIA,LOCAL 07
J-31353351-3

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO LINARES

Contacto: 0241-8716214
alejandro.linares@agrosupplidores.com.ve
www.agrosupplidores.com.ve



AUSKIPRA GN

Composición

Virus vivo Aujeszky ceba Bartha K61 gE negativa > 10 x 5.5 DICT 50
Excipientes c.s.p

Descripción e indicaciones

Prevención de la enfermedad de Aujeszky

Se ha desarrollado la vacuna AUSKIPRA GN, que contiene una cepa atenuada gE negativa (utilizando un ELISA se puede distinguir animales vacunados de los no vacunados), para contribuir así a la progresiva erradicación de la enfermedad. Esta cepa atenuada es apatógena para cerdos de cualquier edad y peso, e incluso para cerdas en avanzado estado de gestación.

La protección en animales sanos aparece a las 48 horas posvacunación, aunque los niveles óptimos inmunitarios no se detectan hasta pasados 7 días



Vía de Administración y dosificación:

Intramuscular, en los músculos del cuello, o intranasal.

Para administración intramuscular, se puede emplear indistintamente el disolvente acuoso rojo (W) o el disolvente blanco (A3)

Para la administración intranasal, se empleará el disolvente acuoso rojo (W), aplicando 1 ml en cada fosa nasal.

Cerdos: 2 ml/ cerdo, a partir de las 10 semanas de edad, independientemente de su peso, edad y sexo.

Cerdas y Verracos: Dos vacunaciones con intervalos de 3 a 4 semanas, a las cerdas de cría al entrar en la explotación o al efectivo reproductor que nunca haya sido vacunado. Posteriormente, se efectuarán revacunaciones cada 4 meses, o bien 4 a 6 semanas antes de cada parto.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Vacunas/Biológicos

Especies: 

Presentaciones:

Caja con 10 frascos de 50 dosis cada uno

Tiempo de retiro:

0 días

Contraindicaciones:

ninguna

Nro. Registro S.A.S.A.: NO APLICA

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PI34N072898