Representante: ILENDER VENEZUELA, C.A.
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O
C-10, Valencia ?Estado Carabobo
J-30124963-1
Gerente de Operaciones
Jaimalida Cardozo
Contacto: 0241-8570368
jcardozo@ilendercorp.com
www.ilendercorp.com

MAGGOTCIDE

Composición

Ciromazina 1 %
Excipientes c.s.p. 100 %

Descripción e indicaciones

El producto se presenta en forma de polvo homogéneo de color blanco cremoso.
INDICACIONES DE USO
MAGGOTCIDE se aplica como aditivo alimenticio para el control de larvas de moscas (Musca domestica, Stomoxys calcitrans).

Vía de Administración y dosificación:

MAGGOTCIDE está destinado para su uso en aves (gallinas en producción).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
MAGGOTCIDE está formulado para ser administrado por vía oral en combinación con el alimento balanceado.
Mezclar 0,5 kg por tonelada de alimento, para obtener una concentración de 5 ppm de principio activo. Se adiciona en el alimento balanceado de gallinas en producción durante cinco a seis semanas continuas, seguido de un periodo de
descanso que puede durar de cuatro a seis semanas.

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Insecticida

Especies:

Presentaciones:

MAGGOTCIDE se encuentra disponible en una presentación:

- Sacos de papel tetralaminar x 25 kg.

Tiempo de retiro:

- Se recomienda retirar el alimento tratado 72 horas antes del sacri ficio de las aves para consumo humano.
-Se recomienda el consumo de huevos 72 horas luego del último tratamiento.

Contraindicaciones:

Ninguna reportada.

Nro. Registro S.A.S.A.: A.I 10.484 **Nro. Registro I.N.S.A.I.** EN TRÁNSITO