



**Representante:** ILENDER VENEZUELA, C.A.  
Avenida Cedeño Torre Empresarial Nivel Mezzanina O  
C-10, Valencia ?Estado Carabobo  
J-30124963-1

**Gerente de Operaciones**  
Jaimalida Cardozo

**Contacto:** 0241-8570368  
jcardozo@ilendercorp.com  
www.ilendercorp.com



## NORCARE

### Composición

Norfloxacina 200 g  
Excipientes c.s.p. 1000 mL

### Descripción e indicaciones

El producto se presenta en solución líquida transparente y límpida, sin partículas en suspensión, de color amarillo claro.

#### INDICACIONES DE USO

NORCARE, presenta un amplio espectro de acción siendo activo contra bacterias

Gram positivas, Gram negativas, parte de la población anaerobia patógena y

microorganismos resistentes a otros antibióticos. La norfloxacina es bactericida ya que inhibe la síntesis bacteriana del ADN e impide la duplicación bacteriana.

### Vía de Administración y dosificación:

NORCARE está formulado para ser administrado por vía oral en combinación con el agua de bebida.

Aves (Pollos y gallinas):

12 mg/kg de peso vivo al día durante 3 a 5 días.

(1 L de NORCARE alcanza para 16,666 kg de peso vivo)

Cerdos:

5 mg/kg de peso vivo al día durante 3 a 5 días.

(1 L de NORCARE alcanza para 40,000 kg de peso vivo)

\*Administrar en forma constante en el agua de bebida de las especies mencionadas. Adminístrese en forma continua durante 3 ? 5 días.

### Forma farmacéutica:

Solución Oral

**Efecto terapéutico:**

Antibióticos/Antimicrobianos

**Especies:****Presentaciones:**

NORCARE se encuentra disponible en una presentación:

- Frasco plástico x 1 L.

**Tiempo de retiro:**

Retirar el producto siete días antes del sacrificio.

**Contraindicaciones:**

- No debe ser usado en gallinas ponedoras cuyos huevos serán destinados al consumo humano.
- No debe ser utilizado simultáneamente con la aplicación de vacunas contra coccidiosis y/o nitrofuranos.

**Nro. Registro S.A.S.A.:** M.I 6.101

**Nro. Registro I.N.S.A.I.** EN TRÁMITE