

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



KIVER Spray

Composición

Ivermectina ??????????????.. 0,25 g
Excipientes c.s.p. ??????????.. 100 cm

Descripción e indicaciones

En Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos. Para Miasis localizadas, cura de ombligos. Efectivo como cicatrizante en castraciones, cirugi?as y heridas en general. Para el tratamiento de parasitosis externas como: Sarna Demodectica, Sarna Sarcoptica, como coadyuvante en tratamientos garrapaticidas.

Vía de Administración y dosificación:

Uso to?pico. En casos de Miasis y como cicatrizante de heridas, se aplica directamente a 15 cm de la lesio?n, diariamente hasta la regeneracio?n del tejido. En casos de Sarna Sarcoptica y Demodectica, aplicar directamente a 15 cm la lesio?n, cubriendo la mayor a?rea posible, repetir diariamente por 25 di?as.

Forma farmacéutica:

Spray / Aerosol

Efecto terapéutico:

Ectoparasitocida

Especies:



Presentaciones:

Envase de 160 cm3

Tiempo de retiro:

No posee



Contraindicaciones:

La Ivermectina esta? contraindicada en razas Collie, Huskie Siberiano y Samoyedo. No aplicar en cachorros menores de 6 semanas.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0