

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



Sprix

Composición

Espiramicina adipato?? 60.000.000 UI
Excipientes c.s.p. ??????.. 100 ml

Descripción e indicaciones

Indicado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos para el tratamiento de Gastroenteritis infecciosa, Neumonía Enzootica, Neumoenteritis, Mastitis, Metritis, Septicemia, Piometra, retención placentaria y Pododermatitis.

Vía de Administración y dosificación:

Vía intramuscular.

Indicado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos para el tratamiento de Gastroenteritis infecciosa, Neumonía Enzootica, Neumoenteritis, Mastitis, Metritis, Septicemia, Piometra, retención placentaria y Pododermatitis.

Bovinos: 5 ml / 25 kg pv., máximo 15 ? 20 ml / animal.

Terneros: 10 ml / 25 kg / pv., máximo 20 ml / animal.

Porcinos de hasta 20 kg: 1 a 1.5 ml / 5 kg pv.

Porcinos de 20 ? 60 kg: 5 ml por animal.

Porcinos de más de 60 kg: 7.5 ml / animal.

Ovinos y Caprinos: 2 ml / 10 kg pv., máximo 15 ml por animal.

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:



Presentaciones:

Frasco de 100 ml en empaques de 24 unidades



Tiempo de retiro:

Carne y Leche: 72 horas.

Contraindicaciones:

No aplica

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0

7942