

**LABORATORIOS
PHARMAKUM DE
VENEZUELA, C.A.**

Representante: LABORATORIOS PHARMAKUM D
Zona Industrial San Vicente II, Conglomerado Manuel
Olivares Betancourt, calle I, lote F, galpón 11-F.
J-31206749-7
Asesor Técnico
María de los Angeles Rivero Mendoza
Contacto: 0243-2455524
mariarivero_m@yahoo.com



Kiver

Composición

Ivermectina?????????????.10 mg
Excipientes c.s.p. ??????????.1 cm³

Descripción e indicaciones

KIVER®, es un desparasitante de amplio espectro; cuyo agente activo es la Ivermectina al 1%, perteneciente al grupo de las Avermectinas.

Parasitos Internos: Ostertagia ostertagi, Cooperia spp, Haemonchus placei, Strongyloides papillosus, Dictyocaulus viviparus, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus axei, Nematodirus spp, Trichuris spp, Ascaris spp y Metastrongylus apri.

Larvas de Moscas: Hypoderma bovis, Dermatobia hominis, Hypoderma lineatum,

Cochliomyia hominivorax.

Acaros Productores de la Sarna: Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis, Psoroptes ovis var. Bovis.

Piojos: Haematopinus eurysternus, Solenoptes capilatum, Damalinia bovis.

Garrapatas: Boophilus microplus.

Miasis umbilicales: Aplicar a las 24 horas de nacido.

Luego de una intervención quirúrgica para prevención de Miasis.

Como coadyuvante en un programa de baño para control de las garrapatas y mosquilla. Es importante el control de las larvas de mosquilla en las heces.

Vía de Administración y dosificación:

Dosificación:

Vía Subcutánea exclusivamente

Bovino:



Dosis: 200 mcg por Kg de p.v. equivalente a 1 ml por cada 50 Kg de p.v.

Porcinos:

Engorde: Al inicio de la etapa.

Verracos: Cada 6 meses

Multiparas: 7 a 14 días antes del parto

Primerizas:

7 a 14 días antes de la monta

7 a 14 días antes del parto

Porcino:

Dosis: 303 mcg por cada Kg de p.v. equivalente a 1 ml por cada 33 Kg de p.v.

Caninos:

Dosis: 0,02 mg/ kg p.v., equivalente a 0,1 ml cada 5 kg p.v., 1 vez por mes o a criterio del Médico Veterinario

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Antiparasitario Endectocida

Especies: 

Presentaciones:

Fascos de 10 cm³ en empaque de 25 unidades. Fascos de 100 cm³ en empaque de 24 unidades.

Fascos de 500 cm³ en empaque de 24 unidades

Tiempo de retiro:

No aplica

Contraindicaciones:

La Ivermectina está contraindicada en razas Collie, Huskie Siberiano y Samoyedo. No aplicar en cachorros menores de 6 semanas.

Nro. Registro S.A.S.A.: No aplica

Nro. Registro I.N.S.A.I. INSAI2041PN33N0