



LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
Av. Antón Phillips, Cruce Calle El Canal, Galpón 3-A
Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
J-07524745-0

Asistente Gerencia Ventas

Amarilis Espinoza

Contacto: 0243-5515432 5516403

ventas@reveex.com

www.reveex.com

OXIVEEX - 20

Composición

Oxitocina sintética 20 UI

Excipiente c.s.p. 1 ml

Descripción e indicaciones

Bovinos, Porcinos, Equinos, Ovinos y Caprinos:

Inducción al parto.

Inercia o atonía uterina.

Involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias.

Expulsión de secundinas y restos de exudados tras el parto.

Iniciación de la lactación tras el parto.

Agalaxia de cerda.

Piometritis y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados.

Tratamientos coadyuvantes a la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica, para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje.



Vía de Administración y dosificación:

Cerdas, cabras y ovejas:

Vía intramuscular o subcutánea: 10 a 15 U.I. (1 a 1,5 mL)

Vía Intravenosa lenta: 5 a 7,5 ml U.I. (0,5 a 0,75 ml)

Vacas y Yeguas:

Vía intramuscular o subcutánea: 15 a 25 U.I. (1,5 a 2,5 mL)

Vía intravenosa lenta: 7,5 a 15 U.I. (0,75 a 1,5 mL)

Forma farmacéutica:

Solución Inyectable

Efecto terapéutico:

Hormonas oxitocinas

Especies:**Presentaciones:**

500 cm³/mL

Tiempo de retiro:

Carne: 2 días

Leche: 24 horas

Contraindicaciones:

No administrar en casos de hipersensibilidad al medicamento.

Distocias por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.

Enfermedades cardiovasculares.

Hembras con predisposición a ruptura uterina.

Administrar con precaución en toxemias.

Cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).

Nro. Registro S.A.S.A.: N/A

Nro. Registro I.N.S.A.I. 2041PN33N071899